

Protocole de soins morsures d'animaux

Risque hémorragique

» Lié à la perte de substance et l'atteinte de gros vaisseaux.

Risque infectieux

» Lié au passage de germes (de la flore orale de l'animal ou de celle de la peau de la personne mordue).

Risque de séquelles fonctionnelles et esthétiques

» En fonction de la localisation et de la gravité de la plaie. Les morsures de chien avec lacérations profondes, arrachements ou écrasements peuvent être particulièrement graves et délabrantes.

Vigilance accrue pour les personnes sous anticoagulant, anti-inflammatoire (AINS) ou immunodéprimées.

Si la vaccination contre le tétanos n'est pas à jour, un rappel du vaccin antitétanique est à effectuer.

Étapes à suivre

- 1 **Stopper l'hémorragie** par une compression manuelle durant 10 à 15 min.
- 2 **Nettoyer** la plaie avec de l'eau et du savon, suivi d'un séchage.
- 3 **Parage** : ablation des corps étrangers et des saillies et application d'un antiseptique et +/- pansement en fonction de la blessure.
- 4 **Évaluer** les lésions vasculaires, nerveuses, tendineuses ou osseuses.

Consultation en urgence si

Plaies à risque :

- 1 Saignement important.
- 2 Risque infectieux : morsure par des NAC* signes de rage, plaies profondes.
- 3 Lésions associées ou risques de séquelles.
- 4 Décollement sous cutané et perte de substance.
- 5 Atteinte vasculaire, tendineuse ou osseuse.
- 6 Plaies à la main au cou ou au visage.

* nouveaux animaux de compagnie

Prise en charge médicale sous 24h si

- 1 Une prise en charge médicale dans les 24h est recommandée pour toutes plaies par morsure même minime.
- 2 La suture de la plaie et la prescription d'antibiotique dépendra de l'aspect de la blessure, de sa localisation, du délai entre la morsure et les soins, et de l'espèce animale en cause.

! Pour plus d'informations, prenez conseil auprès de votre médecin du travail.